



NOTA DE ESCLARECIMENTO: INDICAÇÃO DO USO DE OSELTAMIVIR- 2018

Cenário Atual

Atualmente, no hemisfério norte, vários países estão passando por surtos de Influenza. Nos Estados Unidos da América já foram confirmados mais que o dobro de casos comparado ao mesmo período do ano passado. O subtipo predominante é o Influenza A(H3N2) e os mais acometidos tem sido crianças e idosos.

Considerando que este cenário pode repetir-se no hemisfério sul com a mesma intensidade e considerando a necessidade do uso racional e adequado do antiviral oseltamivir, visando a otimização de seus benefícios e minimizando a possibilidade de resistência viral, é importante que os profissionais estejam atentos para as seguintes indicações de uso:

Indicação do uso do Fosfato de oseltamivir para tratamento

- ❖ Para todos os casos de Síndrome Gripal¹ (SG) que tenham condições e fatores de risco para complicação, independente da situação vacinal, mesmo em atendimento ambulatorial;
- ❖ Para todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda e Grave (SRAG) independente do tempo que transcorreu do início dos sintomas e independente da situação vacinal;

Em pacientes com SRAG e condições e fatores de risco para complicação, o antiviral apresenta benefícios, mesmo se iniciado após 48 horas do início dos sintomas

¹ **Definição de SG:** *Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico.*

Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também, febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.

Fonte: Protocolo de tratamento de Influenza 2015, MS

Condições e fatores de riscos para complicações:

- ✓ Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal);
- ✓ Adultos com ≥ 60 anos;
- ✓ Crianças < de 5 anos;
- ✓ População indígena aldeada;
- ✓ Indivíduos < de 19 anos em uso prolongado de ácido acetilsalicílico;
- ✓ Indivíduos com: pneumopatias (incluindo asma), tuberculosa de todas as formas, cardiovasculopatias, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas (incluindo a anemia falciforme), distúrbios metabólicos (incluindo diabetes *mellitus*), transtornos neurológicos e do



desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, imunossupressão, obesidade.

Indicação do uso de Fosfato de oseltamivir como quimioprofilaxia

- ❖ Pessoas com risco elevado de complicações não vacinadas ou vacinadas a menos de 15 dias após exposição a casos suspeitos ou confirmados de influenza;
- ❖ Crianças menores de 9 anos, primovacinas, com condições ou fatores de risco, que foram expostas ao caso suspeito ou confirmado por influenza no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina ou a menos de 15 dias após a segunda dose;
- ❖ Pessoas com graves deficiências imunológicas ou outros fatores que possam interferir na resposta imunológica à vacinação contra influenza após contato com caso suspeito ou confirmado por influenza;
- ❖ Profissionais de laboratório, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, que tenham manipulado amostras clínicas de origem respiratória que contenham o vírus influenza sem o uso adequado do EPI;
- ❖ Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, e que estiveram envolvidos na realização de procedimentos invasivos, geradores de aerossóis ou na manipulação de secreções de caso suspeito ou confirmados de influenza sem o uso adequado de EPI;
- ❖ Residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa permanência, durante surtos na instituição.

Posologia

Tratamento

Adulto: 75mg, 12/12h, 5 dias
Crianças
≤ 15Kg: 30mg, 12/12h, 5 dias
Entre 15Kg e 23Kg: 45mg, 12/12h, 5 dias
Entre 23Kg e 40Kg: 60mg, 12/12h, 5 dias
> 40Kg: 75mg, 12/12h, 5 dias
Entre 0 a 8 meses: 3mg/Kg, 12/12h, 5 dias
Entre 9 a 11 meses: 3,5mg/Kg, 12/12h, 5 dias

Quimioprofilaxia

Adulto: 75mg, 10 dias
Crianças
≤ 15Kg: 30mg, 10 dias
Entre 15Kg e 23Kg: 45mg, 10 dias
Entre 23Kg e 40Kg: 60mg, 10 dias
> 40Kg: 75mg, 10 dias
Entre 0 a 8 meses: 3mg/Kg,
Entre 9 a 11 meses: 3,5mg/Kg

Importante: Este medicamento está disponível no Sistema Único de Saúde, mediante apresentação de prescrição médica realizada em receituário comum, inclusive da rede privada.



ATENÇÃO

- ✓ Para casos de SG que não tenham condições e fatores de risco para complicação, deve ser considerado o julgamento clínico e o perfil de circulação do vírus, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início da doença.
- ✓ O uso indiscriminado do antiviral não é recomendado, uma vez que pode promover o aparecimento de resistência viral.

Maiores informações: consultar o Protocolo de tratamento de influenza 2015:

http://www.saude.rs.gov.br/upload/1459769314_Protocolo%20de%20Tratamento%20de%20Influenza%202015.pdf