

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DE PESSOAS EXPOSTAS OU INFECTADOS PELO HIV

Grupo alvo	Idade	BCG	HB	Penta/DTp	VIP	Hib	Pneumo 10	Rotavírus	Meningo C	Febre Amarela	Tríplice viral	Varicela	Tetra viral	Hepatite A	Pneumo 23	HPV	Dupla adulto
Criança	Ao nascer	Dose única ⁽⁴⁾	Dose ao nascer														
	2 meses			1ª Dose	1ª Dose (com VIP)		1ª Dose	1ª Dose ⁽⁴⁾									
	3 meses								1ª Dose								
	4 meses			2ª Dose	2ª Dose (com VIP)		2ª Dose	2ª Dose ⁽⁴⁾									
	5 meses								2ª Dose								
	6 meses			3ª Dose	3ª Dose (com VIP)		3ª Dose										
	9 meses									Dose única ⁽⁴⁾							
	12 meses						Reforço		1º Reforço		Dose única ⁽⁴⁾	1ª Dose ⁽⁴⁾		1ª Dose			
	15 meses			1º reforço (com Penta)	1º Reforço (com VIP)							2ª Dose ⁽⁴⁾ (com Tetraviral)	Dose única ⁽⁴⁾				
	18 meses													2ª Dose			
	2 anos														1ª Dose		
	4 anos			2º reforço (com DTP)	2º Reforço (com VIP)												
	6 anos								2º Reforço								
7 anos														2ª Dose			
9 anos																	
Adolescente	10 a 19 anos		4 doses ⁽¹⁾			2 doses ⁽¹⁾			3º Reforço (11 a 14 anos)	Dose única ⁽⁴⁾	2 doses ^(1,4) (até 29 anos)					3 Doses ⁽²⁾	Reforço a cada 10 anos ⁽⁵⁾
Adulto	20 a 59 anos		4 doses ⁽¹⁾						2 doses + 1 reforço ^(1,3)	Dose única ⁽⁴⁾	1 dose ^(1,4) (30 a 49 anos)			2 doses ⁽¹⁾	2 doses ⁽¹⁾	3 doses ⁽²⁾ (até 26 anos)	Reforço a cada 10 anos ⁽⁵⁾
Idoso	60 anos ou mais		4 doses ⁽¹⁾						2 doses + 1 reforço ^(1,3)					2 doses ⁽¹⁾	2 doses ⁽¹⁾		Reforço a cada 10 anos ⁽⁵⁾

(1) Se não tiver recebido o esquema completo na infância.

(2) Esquema para pessoas de 9 a 26 anos 11 meses e 29 dias.

(3) 2 doses com intervalo de 8 semanas entre elas, mais um reforço 5 anos após a última dose.

(4) Solicitar a liberação do médico assistente para realização desta vacina. Mais informações no manual do CRIE.

(5) Se não tiver recebido esquema básico com 3 doses previamente deverá iniciá-lo ou completá-lo.