

Anexo 1- Relatório simplificado sobre a ocorrência de surto de varicela

UF Notificadora: _____ Município: _____

Local do surto: _____

População do local*: _____

Data dos primeiros sintomas

Primeiro caso: ____/____/____

Último caso: ____/____/____

| Formulário para solicitação de vacina varicela e imunoglobulina antivariçela-zoster para bloqueio de surtos de varicela em áreas indígenas, ambiente hospitalar, creches e escolas que atendem crianças menores de sete anos de idade. | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|
| Faixa etária/Grupos | Nº de acometidos | Suscetíveis (não vacinados ou sem comprovação de vacinação) | Nº de doses solicitadas de vacina varicela | Nº de doses solicitadas de imunoglobulina antivariçela-zoster |
| Menores de 09 meses de idade | | | Não se aplica | |
| 09 meses a 6 anos | | | | Não se aplica |
| 7 a 12 anos | | | | Não se aplica |
| Acima de 13 anos | | | | Não se aplica |
| Gestantes | | | Não se aplica | |
| Imunodeprimidos | | | Não se aplica | |
| Total | | | | |

Responsável: _____

Data: ____/____/____

*Número total de pessoas no espaço delimitado do surto, independentemente do *status* imunitário (histórico de vacinação).

Anexo 2- Orientações para vacinação dos contatos de varicela em situações de surto da doença.

| Faixa etária/Situações | Conduta |
|--|--|
| 1. Gestantes, crianças menores de 9 meses de idade e pessoas imunocomprometidas. | Administrar imunoglobulina antivariçela zoster. |
| 2. Criança de 9 meses até 11 meses e 29 dias. | Administrar uma dose de vacina varicela (atenuada). Esta dose não é válida para a rotina, devendo-se manter o esquema recomendado contra a varicela aos 15 meses de idade (com a tetra viral ou tríplice viral + varicela). |
| 3. Criança entre 12 e 14 meses não vacinada contra varicela e sem D1 de tríplice viral. | Administrar uma dose de vacina varicela e a D1 de tríplice viral simultaneamente, e agendar a dose de tetra viral (ou tríplice viral + varicela) para os 15 meses, considerando o intervalo de 30 dias. |
| 4. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral feita há menos de 30 dias e sem dose de vacina varicela. | Administrar uma dose de vacina varicela (atenuada) e não considerá-la como dose válida para a rotina. Agendar a dose de tetra viral (ou tríplice viral + varicela) para os 15 meses, considerando intervalo mínimo de 30 dias. |
| 5. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral feita há mais de 30 dias e sem dose de vacina varicela. | Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela). Agendar uma dose de vacina varicela para os 4 anos. |
| 6. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com uma dose da vacina varicela (atenuada) e não vacinada com tríplice viral. | Administrar D1 de tríplice viral. Agendar a tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) para os 15 meses, considerando o intervalo de 30 dias entre as doses. |
| 7. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral e uma dose de vacina varicela (atenuada). | Verificar agendamento da dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral + varicela) para os 15 meses, considerando o intervalo de 30 dias. |
| 8. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral e uma dose de vacina tetra viral. | Verificar agendamento da dose de varicela (atenuada) para os 4 anos. |
| 9. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com duas doses de vacina varicela (atenuada). | Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada contra varicela. |
| 10. Criança entre 12 e 14 meses vacinada com duas doses de vacina tetra viral. | Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada contra varicela. |
| 11. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade não vacinada com D1 de tríplice viral e sem dose de vacina varicela. | Administrar dose de varicela (atenuada) e D1 de tríplice viral, simultaneamente. Agendar dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral + varicela) com intervalo de 30 dias. |
| 12. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 de tríplice viral feita há menos de 30 dias e sem dose de vacina varicela. | Administrar uma dose de vacina varicela e agendar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela), considerando o intervalo mínimo de 30 dias. |
| 13. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 de tríplice viral feita há mais de 30 dias e sem dose de vacina varicela. | Administrar a tetra viral (ou tríplice viral + varicela), considerando o intervalo mínimo de 30 dias. Agendar a D2 da vacina varicela para os 4 anos, considerando o intervalo de 30 dias entre as doses. |
| 14. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 de tríplice viral e com uma dose de vacina varicela (atenuada). | Administrar uma dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) considerando o intervalo de 30 dias da dose anterior. |
| 15. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 de tríplice viral e com uma dose de vacina tetra viral. | Administrar dose de varicela (atenuada), considerando intervalo de 30 dias da dose anterior. |

| | |
|---|---|
| 16. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral há menos de 30 dias e sem dose de vacina varicela. | Administrar uma dose de vacina varicela (atenuada). Não considerar como dose válida e agendar outra dose da vacina varicela, com intervalo de 30 dias entre as doses. |
| 17. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral há mais de 30 dias e sem dose de vacina varicela. | Administrar D1 de vacina varicela (atenuada). Agendar a D2 da vacina varicela para os 4 anos, considerando o intervalo de 30 dias entre as doses. |
| 18. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral e com uma dose de vacina varicela. | Administrar D2 de vacina varicela. Após essa dose, a criança deve ser considerada vacinada. |
| 19. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com D1 e D2 de tríplice viral e com duas doses de vacina varicela. | Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada. |
| 20. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com duas doses de vacina tetra viral. | Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada. |
| 21. Criança entre 15 meses e menor de 5 anos de idade vacinada com uma dose de vacina varicela (atenuada) e uma dose de tetra viral. | Não administrar nenhuma dose de vacina com componente varicela. Considerar vacinada. |
| 22. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) sem dose de vacina varicela e sem dose de tríplice viral. | Administrar uma dose da vacina varicela (atenuada) e D1 de tríplice viral. Agendar D2 de tríplice viral e D2 de varicela, com intervalo de 30 dias. |
| 23. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com uma dose de vacina tetra viral feita há menos de 30 dias. | Agendar dose da vacina varicela (atenuada) + D1 de tríplice viral, considerando o intervalo de 30 dias. |
| 24. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com uma dose de vacina tetra viral feita há mais de 30 dias. | Administrar dose da vacina varicela (atenuada) + D1 de tríplice viral. |
| 25. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com uma dose de vacina varicela (atenuada) feita há menos de 30 dias. | Agendar D1 de tríplice viral e D2 de varicela, considerando o intervalo de 30 dias. |
| 26. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com uma dose de vacina varicela (atenuada) feita há mais de 30 dias. | Administrar D1 de tríplice viral e D2 de varicela. Agendar D2 de tríplice viral considerando intervalo de 30 dias. |
| 27. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com duas doses de vacina tetra viral. | Não administrar nenhuma dose de vacina varicela. Considerar vacinada. |
| 28. Criança entre 5 e 6 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) com duas doses de vacina varicela (atenuada). | Não administrar nenhuma dose de vacina varicela. Considerar vacinada contra varicela. Administrar D1 de tríplice viral e agendar D2 de tríplice viral com intervalo de 30 dias. |
| 29. Pessoas a partir de 7 anos de idade sem dose de vacina varicela**. | Administrar uma dose de vacina varicela. Verificar a necessidade de outra dose desta vacina, conforme indicação do laboratório produtor. |
| 30. Pessoas a partir de 7 anos de idade vacinada com uma dose de vacina varicela**. | Verificar a necessidade de outra dose da vacina varicela, conforme indicação do laboratório produtor. |
| 31. Pessoas a partir de 7 anos de idade vacinadas com duas dose de vacina varicela. | Não administrar nenhuma dose de vacina varicela. Considerar vacinada. |

As vacinas varicela (atenuada) e tríplice viral podem ser administradas simultaneamente na mesma visita ao serviço de saúde, desde que sejam utilizadas seringas, agulhas e sítios de administração diferentes. Caso não sejam administradas simultaneamente, deve-se respeitar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Indicação da vacina varicela (atenuada) segundo laboratório produtor.**

| Laboratório | Indicação |
|--------------------|--|
| GSK | Duas doses a partir dos 9 meses de idade. |
| Green Cross | Dose única a partir dos 12 meses de idade |
| MSD | <ul style="list-style-type: none">• Dose única de 12 meses a 12 anos de idade• Duas doses a partir dos 13 anos de idade |